



# 寒潮、暴雪、大风三预警齐发 气温持续偏低 养殖场(户)请做好这些防灾措施

寒潮、暴雪、大风,中央气象台连发三预警,多地开启天寒地冻模式。吉林、辽宁、浙江等地局地预计降温可超14℃;湖南、江西、浙江、福建、广西、广东等地局地有大到暴雪。全国迎来一场大范围降温天气,此时,抓好畜禽防寒保暖、疾病防控等,成为养殖场(户)的头等大事。

那么,低温雨雪天,养殖场(户)应该重点关注哪些方面?本期编辑整理了生猪、肉牛等方面的养殖管理注意事项,以供参考。



## 生猪防寒保暖四要点

**加强防寒保暖。**重点是母猪的产房和仔猪保育舍。要加厚垫草,并及时更换和添加干燥新鲜的垫草,保持栏内干燥。猪舍四周进行封窗堵洞,特别是门窗透风的地方要用塑料布、彩条布或旧包装纸加木条钉上,防止寒风进入,但应注意通风。适当增加猪只饲养密度,冬季在同一圈舍内一般应比平常增加三分之一。

**为仔猪提供热源。**采用火源、供暖设施设备等方式保温,增加舍内温度,并加热饮水供仔猪饮用。

**适当增加饲料能量。**怀孕母猪每头每天增加饲喂1公斤饲料,其余生猪(仔猪、小猪、肥猪、泌乳母猪)应充分供料,让其自由采食。也可在原饲料基础上增加10%~15%玉米、小麦、糙米等能量饲料或添加适量油脂,提高饲料能量浓度。

**加强饲养管理。**重点是加强仔猪的管理,防止冻伤、冻僵、冻死,让初生仔猪尽早吃好初乳,并加强仔猪的补料;勤清猪舍粪尿,尽量少用冷水冲洗,保持舍内干燥。

## 严寒天气,肉牛养殖注意六点

雨雪严寒天气,肉牛养殖应该注意些啥?以下几个技术要点一定要做好。

1、除雪除冰、加固整修圈舍、覆盖塑料布等使顶棚不漏雨雪,四壁无风洞,增加牛舍保温效果。

2、及时排除牛舍积水,加厚牛床内垫料,保证牛床干燥,干草、软秸秆、稻草、玉米秸秆等,所有垫料搅拌锯末、炉灰等保温吸湿材料。

3、将粗饲料铡短至2~3厘米饲喂,有利于消化吸收。加喂夜餐。在精料内添加2%的尿素,以补充粗饲料蛋白质营养的不足。

4、补喂精料,因持续低温,平时的喂量已不能保证生长速度,每日增加补喂1~2千克精料。有条件的可喂给混合精料,其配合比例为玉米30%、稻谷(或玉米)20%、饼粕类25%(棉籽饼不超过8%、菜籽饼不超过5%)、米糠(麦麸)20%、食盐2%、小苏打3%。

5、做好接产准备与产后护理工作,产牛舍要特别注意防风保暖,必要时实行人工升温。母牛出现分娩预兆后,应做好接产准备工作。犊牛出生后,要及时擦拭干净身上黏液,并做好保暖工作。

6、冬季是动物病毒性疫病的流行季节,动物的流行性腹泻、口蹄疫等更是高发季节。要实施疫苗接种、加强疫病监控,做好牛场牛舍清洁卫生工作。

## 冬季养羊管护措施

冬季寒风肆虐,气候恶劣,此时疫病容易流行,大多数母羊又恰逢妊娠期,营养需求量大,冬季对羊群精心进行饲养管理,显得十分重要,若稍有疏忽大意,就有可能导致掉膘、流产,甚至出现大批死亡。因此,做好管护措施(保暖、保膘、保胎、保健)将是冬季羊群饲养管理的重点工作。

**一、保暖。**羊的耐寒能力相对较强,但冬季羊舍不能低于0℃,羔羊舍不能低于8℃,产房保持在10℃~18℃为宜。过冬前,要及早检修羊舍,对屋顶和墙壁进行必要的修补,防止漏风漏雪。过于寒冷的季节,应在

圈舍内采用取暖设备。

**二、保膘。**供给羊群优质青干草和作物秸秆,及时补充豆粕、玉米、瓜干、麦麸等精料,保证每天每只羊能吃到200~250克精料,留做种用的小公羊和小母羊,每天每只羊应补饲500~600克精料。每天定时供给2~3次饮水,最好饮用淡盐水,水温达到18℃左右。

**三、保胎。**公、母羊要分开饲养,防止公羊追逐、爬跨怀孕母羊;怀孕母羊要有单独的圈舍,圈舍门尽量宽大一些,舍内饲养数量合适,保证每只孕羊的占地面积达到2~2.5平方米,防止孕羊受到意外的挤压;要多

给孕羊供应精料和淡盐水,必须使用温水,避免饮冰水、吃霜冻草,确保喂饮合理;要加强日常管理,防止羊群内部出现争斗、打架、冲撞等行为。

**四、保健。**冬季羊群易患口蹄疫、链球菌病、痘病、痢疾、感冒、大肠杆菌病等疾病,应及时对羊群进行免疫接种,还要及时对羊群进行预防性驱虫。平时要经常打扫圈舍,保持舍内清洁干燥,及时清除粪便,通过堆积发酵进行无害化处理,残料要进行筛选处理,已经污染的不能再使用。注意经常刷拭羊群体表和被毛,以便促进血液循环、增进机体健康。

## 雨雪天气,散养鸡要做好这些事项

雨雪低温天气,管理好散养鸡群要做好以下五点:

**搭建合适鸡舍和临时棚舍。**散养鸡的鸡舍一定要建在地势比较高且干燥的地方,而且是沙质土壤最好,临时避雨场所也这样选择最优。棚舍中要搭建栖架,确保小鸡有休息的地方。最好能够按照每平方米不超过4只的要求,给小鸡准备雨天时不放牧的大棚活动空间。

**把握放养日龄和放养体重。**一般散养鸡最好养到50日龄,大约体重在1~1.5斤时再实行放养。为什

么要这个阶段和这么大的体重呢?因为这么大的土鸡已经具备了适应野外生存的能力,具有了一定的记忆力和条件反射能力。再者就是这个阶段的鸡已经度过了前期的密集疫苗接种期。

**把握放养密度。**散养鸡的密度不宜过大,鸡在密度越大的情况下暴发疾病的概率就越大。密度过小了不经济,过大了除了容易感染疾病外,也会造成对放养场地植被的严重破坏。

**做好雨雪天消毒防疫。**雨雪天气养殖业最易滋

生疾病,雨雪后应积极做好场地的积水积雪处理工作,特别是对棚舍周围的积水和积雪要及时处置,尽量及时将积水排出去,另外,可采取喷洒消毒液和石灰粉的方式进行消毒处理,以免小鸡感染上球虫和大肠杆菌。

**及时放牧与归牧。**可在放养场地安装音乐播放器,按不同的目的和时间点播放不同的固定音乐。比如放出去的时候可选择一些轻音乐,归牧时可直接录制饲养员的声音,如“开饭了、回来啦”等,这样形成固定的声音后,就比较好管理了。

(本版稿件综合央视新闻、农业农村部网站、中国农网等)