



码上看报



码上订报

农业科技报 社全媒体出品



扫二维码
咨询农科专家



请拨打
问农热线



029-87036603

吉林省长春市读者
高台问：

猪咳嗽咋治疗

答：杨凌老科协咨询专家、杨凌职业技术学院高级兽医师谷撑贤回复说，猪咳嗽可能是地方性喘气病，若是急性的可以注射泰乐菌素，每天一次，连用4-5天。慢性的可以在饲料中拌土霉素，每2斤拌1克，连用7天。

陕西省汉中市读者李晶晶问：

如何为大蒜田除草

答：杨凌老科协咨询专家、杨凌职业技术学院教授党战平回复说，播种前，深翻土地将表土层杂草及杂草种子翻入土壤深层，抑

制出草，减少杂草源。在大蒜播种后至出苗前，亩用33%二甲戊灵乳油200-250毫升，兑水45公斤均匀喷雾于土表。二甲戊灵除草谱广、持效期长，一次施药可防

除大蒜田大部分杂草。在大蒜2叶1心期后、杂草4叶期以前喷施乙氧氟草醚乳油或乙·乙氧乳油进行苗后化学除草。通过以上处理，可达到控制全田草害目的。

陕西省榆林市榆阳区读者常联军问：

玉米叶片先出现水渍状青灰色斑点 后变黄枯死，是什么病害

答：杨凌老科协咨询专家、杨凌职业技术学院教授党战平回复说，根据描述应该是玉米大斑病，该病的防治应以种植抗病品种为主，加强农业防治，辅以必要的药剂防治。

种植户可适期早播，施足基肥，增施磷钾肥。做好中耕除草培土工作，摘除底部2-3片叶。玉米收获后，清洁田园，将秸秆集中处理，经高温发酵用作堆肥。实行轮作。对于价值较高的育种材料及丰产田玉米，可在心叶末期到抽雄期或

发病初期喷洒50%多菌灵可湿性粉剂500倍液或50%甲基硫菌灵可湿性粉剂600倍液、75%百菌清可湿性粉剂800倍液、25%苯菌灵乳油800倍液、40%克瘟散乳油800-1000倍液，隔10天防一次，连续防治2-3次。

陕西省城固县读者刘农斌问：

姜田积水后，大姜出现黄叶、死棵现象，如何防治

答：杨凌老科协咨询专家、杨凌职业技术学院教授党战平回复说，雨后一旦沤根，容易导致大

姜黄叶死棵。姜农可以轮换使用生物药剂和化学药剂进行防治。预防阶段，菜农可连续冲施多粘类芽孢杆菌，补充有益菌。发现死棵

后，姜农可使用氰烯菌酯·苯醚甲环唑+王铜进行灌根。在做好化学防治的基础上，再冲施多粘类芽孢杆菌，防止死棵进一步扩展。

山东省寿光市读者刘小印问：

西红柿萎蔫，茎秆内部呈红褐色 发展很快，如何防治

答：杨凌老科协咨询专家、西北农林科技大学研究员李省印回复说，这是细菌性溃疡病，危害较重，可能导致全棚死棵。即使菜农仅发现只有几棵植株发病，但发病的植株可能很多，所以要尽快

防治。首先拔除已经发现的病株，其次降低棚室湿度，适当减少浇水次数。第三是药剂防治，可用硫酸铜·钙+叶枯唑进行灌根，喷雾时可选用多菌灵+氧化亚铜+丁子·香芹酚，喷施要全面，连茎秆带叶片及地面一起处理。



陕西省澄城县读者陈召召问：

洪涝灾后，受灾苹果园如何补救

答：杨凌老科协咨询专家、杨凌职业技术学院教授马志锋回复说，灾后应重点防治炭疽叶枯病、褐斑病，同时预防果树因缺钙而引起的苦痘病，套袋引起的红点病等

以及红蜘蛛、蚜虫、卷叶蛾、潜叶蛾、刺蛾等虫害。及时排水，土壤稍干时进行翻地，提高土壤透气性。检查果袋口是否牢固，及时排出积水，扩大透气口，防治高温、高湿对苹果带来的日灼及其他病

害。雨后果园杂草必然会快速生长，果农应根据草的高度适时进行割草。前期施肥不足的果园可借这次降雨进行追肥。此次追肥应该严格控制氮肥的用量，以高钾肥料为主，配合中微量元素肥使用。

陕西省宝鸡市读者贾鹏问：

西红柿定植后，植株开花不好 部分花黄化脱落，如何防治

答：杨凌老科协咨询专家、西北农林科技大学研究员李省印回复说，这是一种生理性问题。

近期西红柿落花、花芽分化不良主要由高温环境引起，遮阳过度、浇水多会加重这一问题的发生。缓解建议：加强棚内温湿度管

理，合理遮阳；平衡植株长势及时控旺，避免植株徒长；叶喷磷酸二氢钾配合硼肥，冲施高磷型生根剂促进开花授粉。

(本版内容由赵思懿整理)